



LA "PESTE ROSA" AMENAZA A UN MILLÓN Y MEDIO DE ARGENTINOS



DR. MARIO AMBRONA, jefe del Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual, afirma: "Desde el punto de vista médico, hay epidemia".

Una perniciosa mezcla de sentimientos, que fue desde el natural amor por lo desconocido pasando por arraigados prejuicios hasta llegar a la intolerancia agresiva, amenazó atravesar a la sociedad argentina cuando semanas atrás la crónica periodística informó sobre tres jóvenes homosexuales, uno de Bahía Blanca y dos de la Capital, que atacados por la vulgarmente llamada "Peste rosa" murieron tras largos tratamientos en hospitales de sus respectivas ciudades.

La profunda preocupación superó lógicamente los límites de población homosexual que en nuestro país roza el millón y medio de individuos y despertó preveniciones que hicieron temer a los médicos y psicólogos especialistas un brote de rechazo violento hacia los homosexuales, similar al que se produjo en EE.UU. cuando fue descubierto el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) que tiene en la población homosexual al principal grupo de riesgo y propensión al contagio del hasta ahora irreductible mal, que ya cobró miles de vidas en EE.UU. y Europa Occidental.

En nuestro medio un comisario de a bordo, homosexual, que mantenía frecuentes relaciones con norteamericanos, fue la primera víctima del SIDA.

Aquél fue el primer caso detectado en la Argentina, la información oficial registra 20 casos desde entonces y 5 muertes

correctamente verificadas.




Sin que hasta ahora se halla encontrado una profilaxis o tratamiento eficiente para la cura o prevención del mal, se han realizado costosísimos estudios tanto en EE.UU. como en Francia. Sin embargo, a partir de la individualización del virus -HVT 3- se avizora la posibilidad de que en un tiempo relativamente corto, se pueda producir una droga para prevenir el mal.

En los medios médicos locales también se realizan estudios y existe una comunicación permanente con los principales centros de investigación, que permiten tener un completo panorama de las características de la enfermedad y de las formas que adquiere en nuestro país.

A tal efecto R 2000 entrevistó al Dr. Mario Ambrona que se desempeña como jefe del Programa Nacional de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual, entidad que desde el ámbito oficial se encarga de atender a los pacientes que podrían ser víctimas de SIDA.

-¿Cuál es el origen de la enfermedad?

-Existió un posible antecedente que data de 1950. En ese año un médico publicó en la revista "Jama", la revista médica más importante del mundo, que en poblaciones de una misma región del África que adoptaban la homosexualidad, había una frecuencia llamativa de Kaposi, una forma rara de cáncer, controlable en su manifestación normal, pero que es mu-



EN LA ARGENTINA el ciento por ciento de los casos se dio entre homosexuales. El Kaposi es una forma rara de cáncer (arr.). La foto que está sobre estas líneas muestra el registro de casos en EE.UU.

¿CAMPAÑA EN CONTRA DE LOS HOMOSEXUALES?



Carlos Jáuregui, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, manifestó a R 2000 la preocupación de la entidad que dirige, por el tratamiento que se le estaba dando al tema del SIDA.

"No es posible que se haga sensacionalismo con este problema, queremos que se informe objetivamente a la población y que el Estado avale los estudios que se están haciendo para combatir la enfermedad", dijo.

"Nos parece muy sospechoso que justamente el día que nosotros publicamos una solicitada sobre los derechos de los homosexuales y contra la represión, aparezca la noticia de la muerte de un joven en Bahía Blanca ocurrida, hacía ya varias semanas. Creemos que hay una campaña orquestada y tememos que se repita lo sucedido en EE.UU., cuando la histeria producida por el SIDA culminó en una retrógrada persecución y discriminación"

frecuente e incontrolable en los enfermos de SIDA.

—¿Es una enfermedad exclusiva de homosexuales?

—En EE.UU. el 80 por ciento de los afectados son homosexuales, el 20 restante se reparte entre drogadictos que contagian la enfermedad a través de las agujas que utilizan para sus prácticas, inmigrantes haitianos, mujeres que tienen contactos con homosexuales y niños contagiados por sus madres.

En la Argentina el ciento por ciento de los casos se dieron entre homosexuales.

—¿Es posible hablar de epidemia en la

Argentina, a partir de los últimos tres casos?

—Desde el punto de vista estrictamente médico podemos decir que sí. Los últimos casos, a pesar de su reducido número absoluto, alteraron la frecuencia normal-habitual, lo que los constituye en epidemia.

—¿Qué factores alientan el contagio de SIDA?

—La promiscuidad sexual que generalmente rodea la vida de los homosexuales favorece el contagio.

Si bien no se puede reprimir la sexualidad de las posibles víctimas, los especia-

listas coinciden en recomendar una vida más ordenada y estable.

—¿Qué peligro real existe para los heterosexuales?

—Es casi nulo, ya que exceptuando el contagio a través de la sangre, la única vía es el contacto sexual.

—¿Cuáles son las características del mal?

—El virus destruye las defensas del enfermo. Empiezan a tener pérdida de peso, estado febril, diarreas y sudores nocturnos. Una vez contraído el virus, cualquier infección que sería perfectamente controlable se generaliza adquiriendo un importante poder letal.

—¿La Argentina es una zona de alto riesgo?

—Por el momento todos los enfermos tuvieron contactos sexuales en EE.UU., pero posiblemente empiecen a aparecer casos autóctonos.

—¿Qué medidas de seguridad se han tomado?

—Se suspendió la importación de linfoderivados provenientes de países con SIDA y se alertó a todas las dependencias provinciales del Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual, para captar los posibles casos.

—¿Dónde tiene que dirigirse alguien que tenga síntomas de SIDA?

—A nuestros consultorios de la Av. Vélez Sársfield 514. ■

COMO PREVENSIÓN

El Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente difundió este volante para la población homosexual a través de pacientes de esa condición. Vencer los prejuicios y evitar la histeria colectiva es un factor clave para combatir el mal.

Si usted tiene un amigo homosexual
Si usted ha tenido una relación homosexual
Si usted es homosexual

INFORMESE E INFORME

Sobre el

SIDA

(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida)

Es un conjunto de síntomas que se desarrollan en pacientes jóvenes que han tenido contactos homosexuales.

Sus primeros síntomas no son muy característicos: infecciones a repetición, pérdida de peso y del apetito, diarrea, anemia, lesiones en la piel, fiebre moderada prolongada, inexplicable, aumento de los ganglios en las axilas, los ingles, etc

Si observara algunos de estos síntomas debe concurrir inmediatamente al médico.

El SIDA se debe a una severa pérdida de la inmunidad natural.

Cuanto antes llegue el paciente al médico, y su diagnóstico sea más preciso, las posibilidades de tratamiento son mayores.

Si tiene una duda consulte a su médico.

Diríjase al Programa Nacional de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Av. Vélez Sársfield 514 — 81 0138 y 0273 - Buenos Aires